

Déshydratation

Questions de l'équipe soignante

Changements au niveau de l'apport de liquides

Y a-t-il eu un changement dans la quantité de liquides consommés par la personne, incluant l'eau, le jus, les sucettes glacées et les morceaux de glace?

Si oui, quand ce changement est-il survenu?

La personne consomme-t-elle moins de liquides ou au contraire, a-t-elle plus soif et boit-elle davantage?

Si la personne a du mal à boire, d'où provient cette difficulté?

Est-elle trop faible pour boire ou aspirer avec une paille?

Est-elle trop somnolente pour pouvoir boire de façon sécuritaire?

A-t-elle du mal à avaler? Est-ce qu'elle garde les liquides dans sa bouche et s'étouffe ou tousse lorsqu'elle essaie de les avaler?

Les liquides semblent-ils se bloquer dans l'œsophage lorsque la personne tente d'avalier?

La personne souffre-t-elle de nausées et de vomissements?

Son urine a-t-elle changé?

Produit-elle moins ou plus d'urine?

Y a-t-il une différence dans la couleur (plus foncée et plus concentrée ou plus claire)?

La personne a-t-elle également des problèmes intestinaux?

A-t-elle de la diarrhée? De la constipation?

A-t-elle produit quoi que ce soit – des selles ou des gaz?

A-t-elle des ballonnements?

A-t-elle des douleurs ou de l'inconfort à l'estomac?

Quels médicaments la personne prend-elle?

Des diurétiques, pour stimuler la production d'urine?

Des laxatifs?

Des stéroïdes, comme de la dexaméthasone ou de la prednisone, pouvant entraîner une augmentation des mictions et des pertes en eau?

Des opioïdes?

Quels sont les effets de la baisse de consommation de liquides?

Y a-t-il eu des désaccords entre la personne et les membres de sa famille concernant son apport en liquides?

La question de l'apport en liquides fait-elle naître des sentiments de dépression, de tristesse ou de frustration?